



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה – מערך בריאות העוף

תכנית חיסונים - תרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל)

גיל	חובה	חופשי	סוג התרכיב	שיטת החיסון
יום בקיעה	*		ניוקסל חי ¹ + ברונקיטיס מדבקת חי	ריסוס / ערפול / טפטוף לעין
			מארק ביוולנטי (SB1+HVT) או ריספנס	הזרקה
	*	#	סלמונלה חי (אנטריטידיס) ²	מי שתיה ראשוניים
10 - 12 יום	*		ניוקסל מומת	הזרקה
			אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה
			ברונכיטיס מדבקת חי	מי שתיה או ריסוס
			אבעבועות	דקירה
10 - 21 יום			גמבורו מומת	הזרקה
			או גמבורו חי	מי שתיה
4 שבועות	*		ניוקסל חי	ערפול
			ברונכיטיס מדבקת חי	ערפול
5 - 7 שבועות	*	#	סלמונלה חי (אנטריטידיס)	מי שתיה
			אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה
7 - 9 שבועות			נזלת מדבקת מומת	הזרקה
8 - 12 שבועות			אבעבועות	דקירה
9 - 13 שבועות			לרינגוטרקאיטיס	מריחה בביב
10 - 11 שבועות	*		ניוקסל חי	ערפול
			דלקת מח נגיפית (תרנגולות)	מי שתיה + 2% הזלפה לפה
12 שבועות	*		ניוקסל מומת	הזרקה
			ברונכיטיס מדבקת מומת	הזרקה
			נזלת מדבקת מומת	הזרקה
	*	#	סלמונלה חי (אנטריטידיס) או מומת (טיפימוריום + אנטריטידיס) ³	מי שתיה הזרקה
			אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה
14 - 16 שבועות לא יאוחר מ-7 ימים טרם ההוצאת פרגיות	*		ניוקסל מומת	הזרקה



המשך בדף הבא

*** חיסון חובה**

- ❖ יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי ההסבר באריזות.
- ❖ חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנת התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף.
- ❖ חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.
- ❖ חיסון במי שתיה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה.
- ❖ אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).
- ❖ החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד:
 - רופא וטרינר
 - אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרופאים הווטרינרים (כשרויות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד – 1994.
 - בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.
- ❖ חיסוני חובה: על המגדל לדאוג ולקבל את ההוראות הנוגעות לחיסוני החובה, לפני קבלת להקה. חיסוני החובה מסומנים בכל אחת מתכניות החיסונים.
- ❖ כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי מערך בריאות העוף בלבד.



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה – מערך בריאות העוף

תכנית חיסונים - תרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל) (המשך)

גיל	חובה	הערה	סוג התרכיב	שיטת החיסון
הנשרה	*		ניוקסל מומת	הזרקה
			ברונכיטיס מדבקת מומת	הזרקה
			לרינגוטרקאיטיס	מריחה בביב
	*	#	סלמונלה חי (אנטריטידיס) ⁴ או מומת (טיפימוריום +אנטריטידיס)	מי שתיה הזרקה
			אבעבועות	דקירה
			אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה
במשך כל תקופת ההטלה - פעם בחודשיים -	*		ניוקסל חי	ערפול

*** חיסון חובה**

בהתאם להוראות היצרן אין לטפל בתכשירים בעלי פעילות אנטי חיידקית בטווח זמן של 3 ימים לפני ואחרי מתן החיסון. במידה והלהקה טופלה יש לחזור על החיסון 3 ימים מתום הטיפול.

בלהקות יבוא:

1 יש לבצע את החיסון מיד עם הגעת הלהקה למשק.

2 החיסון הראשון לא לפני גיל 21 יום.

3 תרכיב מומת רק לאחר שחרור הלהקה מהסגר יבוא. ניתן לחסן בתרכיב חי בטרם השחרור.

הנשרה:

4 תרכיב סלמונלה אנטריטידיס חי, יש לבצע את החיסון בהנשרה, לא יאוחר מ- 21 יום לפני הכניסה להטלה.

- ❖ יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי הסבר באריזות.
- ❖ חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנת התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף.
- ❖ חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.
- ❖ חיסון במי שתיה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה.
- ❖ אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).
- ❖ החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד:
 - רופא וטרינר
 - אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרופאים הווטרינרים (כשירות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד – 1994.
 - בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.
- ❖ חיסוני חובה: על המגדל לדאוג ולקבל את ההוראות הנוגעות לחיסוני החובה, לפני קבלת להקה. חיסוני החובה מסומנים בכל אחת מתכניות החיסונים.
- ❖ כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי מערך בריאות העוף בלבד.